

大腸鏡檢查前清腸準備使用說明

洗腎病患
不建議使用

1. 假如清腸不完全，導致殘餘糞便覆蓋於小病灶上（如小息肉或小型癌），將使您健康檢查的完整性大打折扣，因此請務必依照本說明的指示清腸。
2. 藥物（司樂舒口服液）服用禁忌：若有以下情形或疾病，請勿服藥，並主動與本中心聯絡！！孕婦或哺乳婦女、洗腎、腎功能不全患者、鬱血性心衰竭、肝硬化合併腹水者、限制使用含鈉飲食者、先天巨結腸症、腸無法蠕動者、腸阻塞患者等。

司樂舒口服液(SlipFeel Oral Saline Laxative) 服用方法

☐ 乙狀結腸鏡

- (1). 檢查前一天晚上6點將一瓶(45cc.) “司樂舒” 口服液加入360cc.沙士、可樂、麥香紅茶或冷開水稀釋後半小時內慢慢喝完；喝完之後，請分次補充水份約1500cc.或運動飲料，前一天晚餐限喝無渣流質飲料(如粥湯、無渣果汁)。
- (2). 檢查當天早上6點使用Dulcolax肛門塞劑。
【塞劑請存放於冰箱冷藏，避免融化；使用後約30分鐘作用，若腸道已排乾淨，則不會產生作用】

註：肛門塞劑使用時請撥除外殼

☐ 全大腸鏡(180公分)

- (1). 檢查前一天晚上6點將一瓶(45cc.) “司樂舒” 口服液加入360cc.沙士、可樂、麥香紅茶或冷開水稀釋後半小時內慢慢喝完；喝完之後，請分次補充水份約1500cc.或運動飲料，前一天晚餐限喝無渣流質飲料(如粥湯、無渣果汁)。
- (2). 檢查當天清晨4點再將另一瓶(45cc.) “司樂舒” 口服液加入360cc.冷開水(因配合抽血檢查，只能以開水稀釋)後用吸管慢慢喝下，服完瀉劑後禁止再進食或喝水。

註：建議標準使用二瓶需間隔10小時為宜

註：

1. 檢查前一天晚上12點後開始禁食。檢查當日早上起床後，如有長期服用高血壓及抗癲癇等藥物，請喝少量開水將藥物服下。有服用糖尿病用藥者，檢查前一天晚上和檢查當天早上請暫停服用以免低血糖，並將糖尿病藥物帶至健診中心。
2. 多次排便易造成肛門不適，建議排便後用水沖洗肛門或以濕紙巾輕柔按壓乾淨，少用衛生紙擦拭。
3. 服藥後大約30-60分鐘左右開始腹瀉，每次作用時間約2-3小時，因個人體質或有習慣性便秘者，排便時間可能延後，服藥後若1.5小時尚未排便請多走動或用溫水沖洗肛門刺激排便。
4. 服用瀉劑後，如廁次數頻繁，請注意如廁安全，預防跌倒。
5. 由於清腸劑“司樂舒”中含磷，若您同時接受抽血檢查時，血中磷值會暫時性偏高，一般於服用後24-26小時磷值會回復正常。

~檢查完畢後，請陸續補充1000cc.水份，以利藥物排除~

請翻背面